

C-2000 5²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Production cotonnière en Afrique Tropicale francophone (Campagne 1971-72)

Côte d'Ivoire (1971-1972).

Région	Superficie en cotonnier ha	Production de coton-graine t
Nord	22 596	20 819
Ouest	14 544	14 879
Centre	14 260	12 829
Total	51 400	48 527

Sénégal (1971-72).

Région	Superficie en cotonnier ha	Production de coton-graine t
Sine Saloum	4 085	3 403
Sénégal oriental	8 415	10 106
Casamance	5 818	7 700
Total	18 318	21 209

Mali (1971-72).

Région Secteur	Superficie en cotonnier ha	Production de coton-graine t
SIKASSO		
SIKASSO	10 699	10 583,385
KADILO	2 043	2 008,287
KOUTIALA	25 776	22 409,145
YOCROSSO	5 734	4 024,606
BOUGOUNI	1 079	737,000
KOLONDIÉBA	551	292,000
	45 882	40 054,423
SEGOU		
SEGOU	4 124	2 827,905
SAN	3 649	2 123,553
TOMINIAN	982	362,888
	8 555	5 314,346
BAMAKO		
DIOLA	20 064	20 247,172
BAMAKO	2 838	1 816,850
	22 902	22 064,022
Total zone encadrée C.F.D.T.	77 339	67 432,791
Haute-Vallée		428,603
Divers (hors zone C.F.D.T.		77,950
		67 939,344

Haute-Volta (1971-72).

Zone	Superficie en cotonnier ha	Production de coton-graine t
O.R.D. KOUDOUGOU	12 500	2 362 690
O.R.D. KAYA	13 335	1 625 378
O.R.D. DÉBOUGOU	15 340	9 457 375
O.R.D. YATENGA	1 200	12 902
O.R.D. OUGADOUGOU	6 615	676 390
O.R.D. BANFORA	inconnu	20 743
O.R.D. KOUPELA-FADA	1 114	127 797
O.R.D. BOBO-DIOULASSO	19 852	12 426 320
O.R.D. BOUGOURIBA (DIÉBOUGOU)	4 100	1 416 741
Total		28 126 336

Cameroun (1971-72. D'après la C.F.D.T.).

Région	Superficie en cotonnier ha	Production de coton-graine t
GUIDER	14 879	9 224 022
GAROUA	12 230	5 839 845
KAELE	23 840,5	7 589 803
MAROUA	28 447	11 773 944
MORA	19 648	8 769 495
Total	99 044,5	43 197 109

Tchad (1971-72).

Département	Superficie en cotonnier ha	Production de coton-graine t
Mayo-Kebbi	80 962,0	37 048
Tandjilé	36 131,5	15 733
Logone occidentale	49 403,0	14 574
Logone orientale	56 516,5	16 138
Moyen Chari	70 643	21 898
Chari-Baguirmi	6 077,0	2 230
Salamat	1 400,5	490
Ouaddaï	53	28
Guéra	720	331
Total planteurs	301 906,5	108 470
Fermes		320
Total Tchad		108 790

Informations sur la production cotonnière en U.R.S.S.

(Traduction du russe par Michel SERGUEEFF)

Efficacité économique de différentes variétés de cotonnier, en 1970
(Agric. Ouzbékistan, 1972, 2, 43-44).

Variétés	Superficie ensemencée ha	Rendement kg/ha	Récolte globale t	Qualité de coton-graine récolté (kg/ha)			
				première	deuxième	troisième	quatrième
Tachkent 1	500	3 880	1 942	1 192	299	265	186
Tachkent 2	87	4 300	375	274	31	33	37
Tachkent 3	73	3 500	256	176	36	37	7
152-F	200	2 110	422	300	60	40	22

Les variétés « Tachkent » ont été infectées par la Verticilliose dans la proportion de 3 à 3,5 % et la variété 152-F dans la proportion de 77 %.

Estimation économique des variétés de cotonniers, faite en 1970
à la Station expérimentale de Youlsk.
(J. biol. Ouzbékistan, 1972, 4, 18).

Variétés	Dépenses par ha (roubles)	Récolte de coton-graine (kg/ha)	Dépenses par 100 kg de coton-graine (roubles)
103-F	365,35	4 320	8,45
159-F	376,31	4 690	8,02
Tachkent 1	374,31	4 650	8,05
Tachkent 2	378,05	4 720	8,91
Tachkent 3	380,73	4 770	7,90